

FRONT

hovid

កូឡូដ្យូម
COLODIUM



20132

I - រូបភាពឱសថ :

- ជាឱសថប្រភេទកាប់ស៊ុល សំរាប់លេប
- ១ ប្រអប់ មាន ១០ បន្ទះ ក្នុង ១ បន្ទះ មាន ១០ កាប់ស៊ុល

II - សមាសធាតុផ្គុំ : ក្នុង ១ គ្រាប់ មាន :

- Loperamide Hydrochloride 2 mg

III - គុណភាពព្យាបាល :

- ជាប្រភេទឱសថ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺរាក ដោយទប់ស្កាត់ចលនាកន្ត្រាក់របស់ពោះវៀន ឬសាច់ដុំរលោង
- ឱសថនេះប្រើសំរាប់កាត់បន្ថយជំងឺរាកធ្ងន់ធ្ងរ ដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ ឬជំងឺរាកវារីរួមផ្សំនិងជំងឺរាកពោះវៀន ។ ជាការប្រសើរដូចគ្នា ក្នុងការកាត់បន្ថយបរិមាណលាមកដោយរោចផ្នែកចុងពោះវៀនតូចដើម្បីបញ្ចេញលាមកមកក្រៅ ។

IV - ហាមប្រើ :

- ចំពោះកុមារអាយុក្រោម ៦ ឆ្នាំ និងអ្នកជំងឺរាកពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរ
- អ្នកមានជំងឺរាករួមផ្សំនិងជំងឺរាកពោះវៀនដែលមានសារធាតុម្យ៉ាងពេលនៅលើភ្នាសពោះវៀន ដោយការប្រើពូកឱសថអង់ទីប៊ីយូទិក ។

V - ការប្រុងប្រយ័ត្ន :

- ឱសថនេះហាមប្រើចំពោះកុមារអាយុក្រោម ៦ ឆ្នាំ ពីព្រោះវាអាចបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់
- នៅពេលប្រើឱសថនេះត្រូវប្រើពូកឱសថដែលមានសារធាតុអេឡិចត្រូលីត (សេរ៉ូម) ដើម្បីជំនួសជាតិទឹក និងសារធាតុទាំងនេះ ដែលបាត់បង់ដោយជំងឺរាក
- ឱ្យអ្នកជំងឺពិនិត្យឱ្យបានច្រើន ឬប្រើ SRO
- ការប្រើឱសថ ដែលទប់ស្កាត់ចលនាកន្ត្រាក់របស់ពោះវៀនអាចធ្វើឱ្យទប់ស្កាត់ជាតិទឹកនៅក្នុងពោះវៀន ដែលអាចបណ្តាលឱ្យការបាត់បង់ជាតិទឹកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ និងមានការថយចុះនូវពូកសារធាតុអេឡិចត្រូលីតនៅក្នុងឈាម
- ក្នុងករណីសភាពបាត់បង់ជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ ឬបាត់បង់ពូកអេឡិចត្រូលីតច្រើនត្រូវបន្តប្រើ Loperamide រហូតកំរិតជាតិទឹក និងអេឡិចត្រូលីតកើនមកត្រឹមកំរិតធម្មតាវិញ
- ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងស្ត្រីបំបៅកូន មុនប្រើឱសថនេះត្រូវពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ
- នៅពេលប្រើឱសថនេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន និងតាមដានចំពោះផលរំខានមួយចំនួនដូចតទៅ : ទល់លាមក បាត់បង់ជាតិទឹក រាកដោយសារពូកមេរោគ ខ្សោយមុខងារថ្លើម

*** ផលរំខានខ្លះៗ :**

- ឈឺពោះ និងវិបត្តិក្រពះ ពោះវៀន (ពោះវៀនចំមានទំហំធំជាងធម្មតា)
- ស្លូតមាត់
- ធ្លែងធ្លោង អស់កម្លាំង ប្រព័ន្ធប្រសាទកណ្តាលថយចុះ
- ចង្កោរ ក្អួត មិនឃ្លានអាហារ
- វិញ្ញាណប្រាណ ក្រហម និងមានកន្ទួល
- ទល់លាមក



20132

VICOL07-4 (CAM)



BACK

COLODIUM



* ការប្រើសេវាកម្ម :

- បណ្តាសិទ្ធិ : ចង្កោរ ឈឺចុងដង្ហើម ទល់លាមក ចឹងចោង សភាពងាកងុយ បាត់បង់ស្មារតី និងសន្លប់
- ការព្យាបាល : ត្រូវបញ្ជូនអ្នកជម្ងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្រ្គោះជាបន្ទាន់ ។

* ការរក្សាទុក :

- ទុកនៅសីតុណ្ហភាពក្រោម ៣០ អង្សាសេ កុំឱ្យត្រូវសំណើម និងទុកឱ្យផុតពីដៃក្មេង ។

VI - កំរិតនិងរបៀបប្រើ :

- មនុស្សពេញវ័យ : ប្រើពី ៦ ទៅ ៨ម.ក្រ ក្នុង១ថ្ងៃ ឬអាចបង្កើនកំរិតប្រើរហូតដល់ ១៦ម.ក្រ ក្នុង១ថ្ងៃ (ដោយចែកជា ២ ទៅ ៣ដង ក្នុង១ថ្ងៃ)
- កុមារអាយុពី ៦ ទៅ ៨ ឆ្នាំ : ប្រើ ៤.០ ម.ក្រ ក្នុង ១ថ្ងៃ (ដោយចែកជា ២ ទៅ ៣ដង ក្នុង ១ថ្ងៃ)
- កុមារអាយុពី ៩ ទៅ ១២ ឆ្នាំ : ប្រើ ៦.០ ម.ក្រ ក្នុង ១ថ្ងៃ (ដោយចែកជា ២ ទៅ ៣ដង ក្នុង ១ថ្ងៃ) ។

* សំគាល់: កុមារអាយុក្រោម ៦ ឆ្នាំ ហាមប្រើឱសថនេះ ។

VII - លេខបញ្ជីកាឱសថ : CAM R₃ 0537IP-97

VIII - ផលិតដោយ : **HOVID Bhd.**

121, Jalan Tunku Abdul Rahman (Jalan Kuala Kangsar), 30010 Ipoh, Perak, Malaysia.
Lot 56442, 7 1/2 Miles, Jalan Ipoh/Chemor, 31200 Chemor, Perak, Malaysia.

បានបកប្រែនិងត្រួតពិនិត្យដោយនាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង ។

